



PERÚ

Ministerio
de Salud

INSTITUTO DE GESTIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD

HOSPITAL CAYETANO
HEREDIA

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA



Lima - Perú

AÑO:2015

EGRESOS HOSPITALARIOS



AÑO: 2015

PARTOS – RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 1 observamos en los partos atendidos en el hospital que el año 2003 alcanzo la mayor producción (5954). Entre los años 2009 al 2013 se presento una producción estacionaria siendo en el año 2013 4488 partos y 2014 de 4453. Lo mismo se observa en los

Recién Nacidos, siendo en el año 2013 de 4436 y año 2014 de 4401 recién nacidos, en el año 2015 se observa una disminución con 4315 partos y 4324 recién nacidos. (Cuadro N°1-Gráfico N° 1-2)

Cuadro N°1.- Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital según años.

PARTOS-RECIEN NACIDOS SEGÚN AÑOS		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
2000	3157	3093
2001	2786	2750
2002	5365	5294
2003	5954	5856
2004	5796	5714
2005	5678	5593
2006	4761	4674
2007	5500	5428
2008	5555	5492
2009	4022	3958
2010	4794	4743
2011	4544	4493
2012	4729	4665
2013	4488	4436
2014	4453	4401
2015	4315	4324

FUENTE:DPTO.GINECO-OBSTETRICIA

Gráfico N° 1.- Partos atendidos en el Hospital.





Gráfico N° 2.- Recién Nacidos atendidos en el Hospital



PARTOS ATENDIDOS – RECIEN NACIDOS

En el Cuadro N° 2 observamos que la producción del año 2015 fue de 4315 partos, con 4324 Recién Nacidos. Se


observa un incremento en el mes de mayo con 424 partos, con 423 recién nacidos. Cuadro N° 2- Gráfico N°3)

Cuadro N°2- Partos y Recién Nacidos atendidos en el Hospital.

PARTOS-RECIEN NACIDOS		
AÑO:2015		
AÑO	PARTOS	R.NACIDOS
	4315	4324
ENERO	346	345
FEBRERO	368	365
MARZO	386	389
ABRIL	384	387
MAYO	424	423
JUNIO	388	390
JULIO	381	384
AGOSTO	417	418
SETIEMBRE	359	362
OCTUBRE	245	245
NOVIEMBRE	291	290
DICIEMBRE	326	326

FUENTE: DPTO. GINECO-OBSTETRICIA

Gráfico N° 3.- Partos Y Recién Nacidos atendidos en el Hospital



EGRESOS HOSPITALARIOS

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios, representó la mayor demanda de atención al sexo femenino con el 67.9% y el 32.1% correspondió al sexo masculino. La primera causa fue Parto por Cesárea, sin otra especificación representando el 8.1% con respecto al total de las atenciones en hospitalización. La segunda causa fue la parto por cesarea electiva con el 5.8% La

tercera causa fue la Apendicitis aguda, no especificada con el 4.4% respresentando para el sexo masculino el 2.4% y para el sexo femenino el 2.0%, Asimismo se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontaneo, sin otra especificación con el 13.3% (Cuadro N°3, Gráfico N°4-5).

Cuadro N°3.- Principales causas de egresos hospitalarios, según sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA AÑO: 2015																					
CAUSAS	NIÑO			ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
Parto por cesárea, sin otra especificación	0	0	0	0	85	85	0	795	795	0	350	350	0	0	0	0	0.0	1230	8.1	1230	8.1
Parto por cesárea electiva	0	0	0	0	6	6	0	463	463	0	408	408	0	0	0	0	0.0	877	5.8	877	5.8
Apendicitis aguda, no especificada	77	53	130	46	52	98	112	92	204	101	98	199	25	15	40	361	2.4	310	2.0	671	4.4
Ictericia neonatal, no especificada	182	196	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	1.2	196	1.3	378	2.5
Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	0	1	1	1	5	6	5	29	34	30	169	199	20	80	100	56	0.4	284	1.9	340	2.2
Aborto espontáneo incompleto, sin complicación	0	1	1	0	30	30	0	157	157	0	114	114	0	0	0	0	0.0	302	2.0	302	2.0
Neumonía viral, no especificada	120	93	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	121	0.8	93	0.6	214	1.4
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	23	15	38	20	11	31	28	15	43	44	36	80	11	9	20	126	0.8	86	0.6	212	1.4
Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	0	0	0	0	3	3	4	15	19	26	94	120	23	41	64	53	0.3	153	1.0	206	1.4
Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción n	2	1	3	1	0	1	4	3	7	38	19	57	82	38	120	127	0.8	61	0.4	188	1.2
Leiomioma del útero, sin otra especificación	0	0	0	0	1	1	0	4	4	0	154	154	0	2	2	0	0.0	161	1.1	161	1.1
Asma, no especificado	80	69	149	3	6	9	1	0	1	1	0	1	0	0	0	85	0.6	75	0.5	160	1.0
Otros quistes ováricos y los no especificados	0	2	2	0	14	14	0	45	45	0	73	73	0	5	5	0	0.0	139	0.9	139	0.9
Neumonía, no especificada	12	6	18	4	1	5	4	3	7	13	9	22	41	43	84	74	0.5	62	0.4	136	0.9
Prolapso genital femenino, no especificado	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	71	71	0	61	61	0	0.0	134	0.9	134	0.9
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	12	19	31	2	3	5	5	6	11	8	20	28	24	32	56	51	0.3	80	0.5	131	0.9
Epilepsia, tipo no especificado	53	41	94	7	7	14	1	2	3	3	1	4	1	1	2	65	0.4	52	0.3	117	0.8
Otros recién nacidos pretérmino	57	59	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.4	59	0.4	116	0.8
Encefalitis viral, no especificada	40	33	73	13	5	18	10	4	14	2	0	2	2	0	2	67	0.4	42	0.3	109	0.7
Bronquiolitis aguda, no especificada	61	37	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0.4	37	0.2	98	0.6
Todas las demás enfermedades	768	588	1356	169	163	332	473	934	1407	1103	1365	2468	889	843	1732	3402	22.3	3893	25.5	7295	47.9
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	0	0	0	154	154	0	1295	1295	0	581	581	0	0	0	0	0.0	2030	13.3	2030	13.3

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico N° 4.- Diez primeras causas de egresos hospitalarios.





Gráfico N°5. - Egresos Hospitalarios, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA NIÑO Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida niño y sexo el 55.1% representó al sexo masculino, y el 44.9% al sexo femenino. Como primera causas fue la Ictericia neonatal, no especificada con el 14.0%, correspondiendo 7.3% al sexo femenino y el 6.7% al sexo masculino. La segunda causas correspondió a

la Neumonía viral, no especificada con el 7.9%, correspondiendo el 4.4% al sexo masculino, y el 3.4% al sexo femenino. La tercera causa Asma, no especificada, con el 5.5%, correspondiendo al 3.0% al sexo masculino, y el 2.6% al sexo femenino. (Cuadro N°4. Gráfico N°6,7).

Cuadro N° 4.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida niño y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA NIÑO AÑO: 2015																											
CAUSAS	0-29 DIAS			1-11 MESES			1-2 AÑOS			3-4 AÑOS			5-9 AÑOS			10-11AÑOS			TOTALES								
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%			
	511	469	980	291	224	515	186	162	348	118	84	202	289	204	493	92	71	163	1487	55.1	1214	44.9	2701	100.00			
Ictericia neonatal, no especificada	182	196	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	6.7	196	7.3	378	14.0
Neumonía viral, no especificada	1	0	1	66	45	111	41	40	81	11	6	17	1	2	3	0	0	0	120	4.4	93	3.4	213	7.9			
Asma, no especificado	0	0	0	2	2	4	4	5	9	25	20	45	37	37	74	12	5	17	80	3.0	69	2.6	149	5.5			
Apendicitis aguda, no especificada	0	0	0	0	0	0	2	4	6	5	3	8	43	29	72	27	17	44	77	2.9	53	2.0	130	4.8			
Otros recién nacidos pretérmino	50	50	100	7	9	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	2.1	59	2.2	116	4.3			
Bronquiolitis aguda, no especificada	0	1	1	54	30	84	7	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	2.3	37	1.4	98	3.6			
Epilepsia, tipo no especificado	0	0	0	10	11	21	18	16	34	10	6	16	15	5	20	0	3	3	53	2.0	41	1.5	94	3.5			
Encefalitis viral, no especificada	1	0	1	6	2	8	4	5	9	6	4	10	15	17	32	8	5	13	40	1.5	33	1.2	73	2.7			
Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada	26	33	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1.0	33	1.2	59	2.2			
Fractura de la epifisis inferior del húmero	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	4	10	13	12	25	3	2	5	23	0.9	19	0.7	42	1.6			
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	0	1	1	9	8	17	14	3	17	3	1	4	0	0	0	0	1	1	26	1.0	14	0.5	40	1.5			
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	19	8	27	3	3	6	23	0.9	15	0.6	38	1.4			
Traumatismo intracraneal, no especificado	1	0	1	4	0	4	11	1	12	3	5	8	4	3	7	1	4	5	24	0.9	13	0.5	37	1.4			
Otros recién nacidos con sobrepeso para la edad gestacional	19	15	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.7	15	0.6	34	1.3			
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	0	0	0	9	13	22	3	1	4	0	0	0	0	4	4	0	1	1	12	0.4	19	0.7	31	1.1			
Todas las demás enfermedades	231	173	404	124	104	228	81	79	160	48	32	80	142	87	229	38	30	68	664	24.6	505	18.7	1169	43.3			

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2015

Gráfico Nº 6.- Diez primeras causas, etapa de vida niño.





Gráfico Nº7.- Egresos Hospitalarios, etapa de vida niño, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adolescente y sexo, el 67.2% representó al sexo femenino, y el 32.8% al sexo masculino. Como primera causa fue Apendicitis aguda, no especificada con el 12.1% con el 6.4% para el sexo femenino, para el sexo masculino con el 5.7%. La segunda causa fue

la Parto por cesárea, sin otra especificación con el 10.5% del total de las atenciones. La tercera causa fue Apendicitis aguda con peritonitis generalizada con el 3.8% con el 2.5% para el sexo masculino y el 1.4% para el sexo masculino. (Cuadro Nº5. Gráfico Nº 8-9).

Cuadro Nº05.- Principales causas en Egresos Hospitalarios en etapa de vida adolescente y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE AÑO: 2015												
CAUSAS	12-14 AÑOS			15-17 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M		F		Nº	
							%	%	%	%	Nº	%
	140	142	282	126	404	530	266	32.8	546	67.2	812	100.00
Apendicitis aguda, no especificada	23	29	52	23	23	46	46	5.7	52	6.4	98	12.1
Parto por cesárea, sin otra especificación	0	7	7	0	78	78	0	0.0	85	10.5	85	10.5
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	9	6	15	11	5	16	20	2.5	11	1.4	31	3.8
Aborto espontáneo incompleto, sin complicación	0	5	5	0	25	25	0	0.0	30	3.7	30	3.7
Encefalitis viral, no especificada	6	5	11	7	0	7	13	1.6	5	0.6	18	2.2
Insuficiencia renal crónica, no especificada	6	3	9	5	2	7	11	1.4	5	0.6	16	2.0
Falla y rechazo de trasplante de riñón	3	3	6	7	2	9	10	1.2	5	0.6	15	1.8
Epilepsia, tipo no especificado	6	7	13	1	0	1	7	0.9	7	0.9	14	1.7
Insuficiencia renal terminal	2	1	3	9	2	11	11	1.4	3	0.4	14	1.7
Otros quistes ováricos y los no especificados	0	7	7	0	7	7	0	0.0	14	1.7	14	1.7
Asma, no especificado	3	6	9	0	0	0	3	0.4	6	0.7	9	1.1
Infección del riñón en el embarazo	0	0	0	0	8	8	0	0.0	8	1.0	8	1.0
Trabajo de parto prematuro con parto prematuro	0	0	0	0	8	8	0	0.0	8	1.0	8	1.0
Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio	5	2	7	1	0	1	6	0.7	2	0.2	8	1.0
Apendicitis aguda con absceso peritoneal	2	2	4	1	1	2	3	0.4	3	0.4	6	0.7
Todas las demás enfermedades	75	51	126	61	97	158	136	16.7	148	18.2	284	35.0
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	8	8	0	146	146	0	0.0	154	19.0	154	19.0

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2015

Gráfico Nº 8.- Diez primeras causas, etapa de vida adolescente.





Gráfico Nº 9.- Egresos Hospitalarios, etapa de vida adolescente, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA JOVEN Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida joven y sexo el 85.7% representó al sexo femenino y el 14.3% al sexo masculino. Como primera causa fue Parto por cesárea, sin otra especificación con el 17.6%. La segunda

causa Parto por cesárea electiva, con el 10.3%. La tercera causa Apendicitis aguda, no especificada, con el 4.5% con el 2.5% para el sexo masculino y el 2.0% para el sexo femenino. (Cuadro Nº 6. Gráfico Nº 10,11).

Cuadro Nº 6.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida joven y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA JOVEN AÑO: 2015													
CAUSAS	18-19 años			20-29 años			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	Nº	%	
	120	691	811	527	3173	3700	647	14.3	3864	85.7	4511	100.00	
Parto por cesárea, sin otra especificación	0	148	148	0	647	647	0	0.0	795	17.6	795	17.6	
Parto por cesárea electiva	0	28	28	0	435	435	0	0.0	463	10.3	463	10.3	
Apendicitis aguda, no especificada	36	19	55	76	73	149	112	2.5	92	2.0	204	4.5	
Aborto espontáneo incompleto, sin complicación	0	30	30	0	127	127	0	0.0	157	3.5	157	3.5	
Infección del riñón en el embarazo	0	14	14	0	57	57	0	0.0	71	1.6	71	1.6	
Trabajo de parto prematuro con parto prematuro	0	14	14	0	39	39	0	0.0	53	1.2	53	1.2	
Hiperemesis gravídica leve	0	8	8	0	40	40	0	0.0	48	1.1	48	1.1	
Otros quistes ováricos y los no especificados	0	10	10	0	35	35	0	0.0	45	1.0	45	1.0	
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	6	3	9	22	12	34	28	0.6	15	0.3	43	1.0	
Embarazo ectópico, no especificado	0	5	5	0	32	32	0	0.0	37	0.8	37	0.8	
Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	0	4	4	5	25	30	5	0.1	29	0.6	34	0.8	
Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio	0	4	4	0	28	28	0	0.0	32	0.7	32	0.7	
Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias	0	1	1	23	4	27	23	0.5	5	0.1	28	0.6	
Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio	0	5	5	0	18	18	0	0.0	23	0.5	23	0.5	
Falla y rechazo de trasplante de riñón	1	3	4	3	15	18	4	0.1	18	0.4	22	0.5	
Todas las demás enfermedades	77	120	197	398	566	964	475	10.5	686	15.2	1161	25.7	
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	275	275	0	1020	1020	0	0.0	1295	28.7	1295	28.7	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº 10.- Diez primeras causas, etapa de vida joven.





Gráfico Nº 11.- Egresos Hospitalarios, etapa de vida joven, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto y sexo, el 72.2% representó al sexo femenino y el 27.8% al sexo masculino. La primera causa fue el Parto por cesárea electiva, con el 8.3% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa fue el parto

por cesárea, sin otra especificación con el 7.1% con relación al total de las atenciones. La tercera causa Apendicitis aguda, no especificada, con el 4.0%, correspondiendo el 2.0 al sexo femenino y el 2.0% al sexo masculino. Cuadro Nº 7. Gráfico Nº 12,13).

Cuadro Nº 7.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADULTO AÑO: 2015													
CAUSAS	30-44 AÑOS			45-59 AÑOS			TOTALES						
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%	
	645	2525	3170	724	1037	1761	1369	27.8	3562	72.2	4931	100.00	
Parto por cesárea electiva	0	404	404	0	4	4	0	0.0	408	8.3	408	8.3	
Parto por cesárea, sin otra especificación	0	349	349	0	1	1	0	0.0	350	7.1	350	7.1	
Apendicitis aguda, no especificada	70	51	121	31	47	78	101	2.0	98	2.0	199	4.0	
Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	11	77	88	19	92	111	30	0.6	169	3.4	199	4.0	
Leiomioma del útero, sin otra especificación	0	74	74	0	80	80	0	0.0	154	3.1	154	3.1	
Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	8	36	44	18	58	76	26	0.5	94	1.9	120	2.4	
Aborto espontáneo incompleto, sin complicación	0	112	112	0	2	2	0	0.0	114	2.3	114	2.3	
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	20	16	36	24	20	44	44	0.9	36	0.7	80	1.6	
Otros quistes ováricos y los no especificados	0	49	49	0	24	24	0	0.0	73	1.5	73	1.5	
Prolapso genital femenino, no especificado	0	12	12	0	59	59	0	0.0	71	1.4	71	1.4	
Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias	32	12	44	10	8	18	42	0.9	20	0.4	62	1.3	
Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena	9	5	14	29	14	43	38	0.8	19	0.4	57	1.2	
Otras hernias ventrales y las no especificadas sin obstrucción o gangrena	2	12	14	13	18	31	15	0.3	30	0.6	45	0.9	
Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda	7	10	17	7	14	21	14	0.3	24	0.5	38	0.8	
Fractura de otras partes de la pierna	11	13	24	6	7	13	17	0.3	20	0.4	37	0.8	
Todas las demás enfermedades	475	716	1191	567	585	1152	1042	21.1	1301	26.4	2343	47.5	
Parto único espontáneo, sin otra especificación	0	577	577	0	4	4	0	0.0	581	11.8	581	11.8	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº 12.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto.





Gráfico Nº 13.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto.



PRINCIPALES CAUSAS EN EGRSOS HOSPITALARIOS, SEGÚN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios según etapa de vida adulto mayor y sexo, el 51.1% representó al sexo femenino y el 48.9% al sexo masculino. La primera causa fue la Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena con el 5.2%, correspondiendo el 3.6% al sexo masculino y el 1.7% al sexo

femenino, La segunda causa fue Cálculos de la vesícula biliar sin colecistitis con el 4.4% correspondiendo el 3.5% al sexo femenino y el 0.9% al sexo masculino. La tercera causa Neumonía, no especificada, con el 3.7%, para el sexo femenino el 1.9% y para el sexo masculino con el 1.8%. Cuadro N° 8. Gráfico N° 14,15).

Cuadro N° 8.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, según etapa de vida adulto mayor y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR AÑO: 2015												
CAUSAS	60-64 AÑOS			65 A MAS AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	229	263	492	890	907	1797	1119	48.9	1170	51.1	2289	100.00
Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena	12	8	20	70	30	100	82	3.6	38	1.7	120	5.2
Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	5	31	36	15	49	64	20	0.9	80	3.5	100	4.4
Neumonía, no especificada	3	1	4	38	42	80	41	1.8	43	1.9	84	3.7
Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas	3	3	6	32	26	58	35	1.5	29	1.3	64	2.8
Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	7	14	21	16	27	43	23	1.0	41	1.8	64	2.8
Hiperplasia de la próstata	9	0	9	53	0	53	62	2.7	0	0.0	62	2.7
Prolapso genital femenino, no especificado	0	22	22	0	39	39	0	0.0	61	2.7	61	2.7
Fractura del cuello de fémur	1	3	4	16	41	57	17	0.7	44	1.9	61	2.7
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	2	3	5	22	29	51	24	1.0	32	1.4	56	2.4
Uropatía obstructiva y por reflujo, sin otra especificación	7	0	7	43	0	43	50	2.2	0	0.0	50	2.2
Otras hernias ventrales y las no especificadas sin obstrucción o gangrena	5	9	14	11	20	31	16	0.7	29	1.3	45	2.0
Septicemia, no Especificada	4	1	5	16	23	39	20	0.9	24	1.0	44	1.9
Fractura pertrocanteriana	0	0	0	15	29	44	15	0.7	29	1.3	44	1.9
Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación	6	10	16	16	10	26	22	1.0	20	0.9	42	1.8
Apendicitis aguda, no especificada	5	6	11	20	9	29	25	1.1	15	0.7	40	1.7
Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena	3	7	10	11	11	22	14	0.6	18	0.8	32	1.4
Insuficiencia respiratoria, no especificada	2	0	2	12	13	25	14	0.6	13	0.6	27	1.2
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	1	5	6	8	11	19	9	0.4	16	0.7	25	1.1
Gonartrosis, no especificada	1	1	2	8	14	22	9	0.4	15	0.7	24	1.0
Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada	2	4	6	6	9	15	8	0.3	13	0.6	21	0.9
Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena	2	0	2	14	5	19	16	0.7	5	0.2	21	0.9
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	3	4	7	8	5	13	11	0.5	9	0.4	20	0.9
Insuficiencia renal terminal	2	1	3	10	7	17	12	0.5	8	0.3	20	0.9
Insuficiencia renal crónica, no especificada	2	3	5	7	8	15	9	0.4	11	0.5	20	0.9
Colecistitis aguda	4	2	6	7	6	13	11	0.5	8	0.3	19	0.8
Todas las demás enfermedades	138	125	263	416	444	860	554	24.2	569	24.9	1123	49.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2015

Gráfico Nº 14.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.




Gráfico Nº 15.- Diez primeras causas, etapa de vida adulto mayor.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "A", Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina "A" el 51.7% representa al sexo femenino y el 48.3% al sexo masculino. La primera causa Neumonía, no especificada con el 14.2% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 7.4% al sexo masculino y el 6.8% al sexo femenino. La segunda causa Infección de vías urinarias, sitio no especificado, con el 10.2% correspondiendo

el 6.8% al sexo femenino y el 3.4% al sexo masculino. La tercera causa Otras enfermedades cerebro vasculares especificadas con el 9.3%, correspondiendo el 4.0% al sexo femenino y el 5.3% al sexo masculino, podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos mayores seguido de los pacientes adultos. (Cuadro Nº09. Gráfico Nº 16,17).

Cuadro Nº 09.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Medicina "A", y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE MEDICINA "A" AÑO: 2015																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			M	%	F	%	N°	%
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	4	6	10	10	6	16	48	44	92	94	111	205	156	48.3	167	51.7	323	100.00
Neumonía, no especificada	1	1	2	2	1	3	7	5	12	14	15	29	24	7.4	22	6.8	46	14.2
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	0	0	0	1	1	2	3	4	7	7	17	24	11	3.4	22	6.8	33	10.2
Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas	0	0	0	0	0	0	5	1	6	12	12	24	17	5.3	13	4.0	30	9.3
Insuficiencia renal terminal	2	1	3	1	1	2	3	7	10	4	7	11	10	3.1	16	5.0	26	8.0
Septicemia, no Especificada	0	0	0	0	0	0	2	4	6	9	7	16	11	3.4	11	3.4	22	6.8
Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mención de complicación	0	0	0	0	0	0	3	3	6	9	6	15	12	3.7	9	2.8	21	6.5
Hemorragia intraencefálica, no especificada	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1	8	9	5	1.5	8	2.5	13	4.0
Insuficiencia respiratoria, no especificada	0	0	0	0	0	0	1	4	5	4	3	7	5	1.5	7	2.2	12	3.7
Insuficiencia cardíaca congestiva	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	10	4	1.2	7	2.2	11	3.4
Insuficiencia renal crónica, no especificada	0	2	2	0	0	0	1	1	2	3	4	7	4	1.2	7	2.2	11	3.4
Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	2	1	3	6	1	7	8	2.5	2	0.6	10	3.1
Enfermedad isquémica crónica del corazón, no especificada	0	0	0	0	0	0	4	2	6	3	1	4	7	2.2	3	0.9	10	3.1
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	0	0	0	1	0	1	2	0	2	3	4	7	6	1.9	4	1.2	10	3.1
Otras cirrosis del hígado y las no especificadas	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	6	8	4	1.2	6	1.9	10	3.1
Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación	0	1	1	0	3	3	0	6	6	0	0	0	0	0.0	10	3.1	10	3.1
Anemia aplásica, sin otra especificación	0	0	0	2	0	2	1	0	1	5	1	6	8	2.5	1	0.3	9	2.8
Púrpura trombocitopénica idiopática	0	1	1	2	0	2	1	4	5	0	1	1	3	0.9	6	1.9	9	2.8
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	3	6	5	1.5	3	0.9	8	2.5
Síndrome nefrótico, no especificada	1	0	1	1	0	1	5	0	5	0	1	1	7	2.2	1	0.3	8	2.5
Fibrilación y aleteo auricular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	3	0.9	4	1.2	7	2.2
Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	2	0.6	5	1.5	7	2.2
Derrame pleural no clasificado en otra parte	0	0	0	1	2	1	1	2	1	2	3	3	3	0.9	4	1.2	7	2.2
Todas las demás enfermedades	4	4	8	25	22	47	70	59	129	65	71	136	164	50.8	156	48.3	320	99.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº 16.- Diez primeras causas Servicio de Medicina “A”





Gráfico Nº 17.- Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina “A”, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE MEDICINA "B", Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Medicina "B" el 52.0% representa al sexo masculino y el 48.0% al sexo femenino. La primera causa Neumonía no especificada con el 6.5% con respecto al total de las atenciones correspondiendo el 3.5% al sexo masculino y el 3.0% al sexo femenino. La segunda causa Otras enfermedades cerebro vasculares especificadas con el 6.3% con respecto al

total de las atenciones correspondiendo al 2.8% al sexo femenino y el 3.4% al sexo masculino. La tercera causa Infección de vías urinaria, sitio no especificado con el 3.9% correspondiendo el 2.5% al sexo femenino y el 1.4% al sexo masculino, observamos también que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los adultos mayores seguido de los pacientes adultos (Cuadro Nº10. Gráfico Nº 18,19).

Cuadro Nº 10.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina "B", y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE MEDICINA "B" AÑO: 2015																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
Neumonía, no especificada	0	0	0	1	1	2	4	2	6	26	23	49	31	3.5	26	3.0	57	6.5
Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas	0	0	0	1	0	1	6	8	14	23	17	40	30	3.4	25	2.8	55	6.3
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	0	0	0	1	1	2	2	8	10	9	13	22	12	1.4	22	2.5	34	3.9
Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación	0	0	0	0	0	0	9	5	14	8	9	17	17	1.9	14	1.6	31	3.5
Insuficiencia renal terminal	2	1	3	1	5	6	9	4	13	6	1	7	18	2.0	11	1.3	29	3.3
Septicemia, no Especificada	0	0	0	1	0	1	2	5	7	8	10	18	11	1.3	15	1.7	26	3.0
Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación	2	0	2	2	10	12	0	10	10	0	0	0	4	0.5	20	2.3	24	2.7
Insuficiencia renal crónica, no especificada	2	0	2	0	1	1	3	7	10	6	5	11	11	1.3	13	1.5	24	2.7
Otras cirrosis del hígado y las no especificadas	0	0	0	1	0	1	8	1	9	4	5	9	13	1.5	6	0.7	19	2.2
Insuficiencia respiratoria, no especificada	0	0	0	0	0	0	3	3	6	5	6	11	8	0.9	9	1.0	17	1.9
Enfermedad isquémica aguda del corazón, no especificada	0	0	0	0	0	0	3	3	6	6	3	9	9	1.0	6	0.7	15	1.7
Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	8	10	4	0.5	9	1.0	13	1.5
Enfermedad isquémica crónica del corazón, no especificada	0	0	0	0	0	0	2	1	3	8	1	9	10	1.1	2	0.2	12	1.4
Encefalitis viral, no especificada	2	0	2	4	2	6	1	0	1	2	0	2	9	1.0	2	0.2	11	1.3
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	0	1	1	0	1	1	4	2	6	3	0	3	7	0.8	4	0.5	11	1.3
Linfoma no Hodgkin, no especificado	0	0	0	0	1	1	1	0	1	5	3	8	6	0.7	4	0.5	10	1.1
Hemorragia intraencefálica, no especificada	0	0	0	0	0	0	3	5	8	1	1	2	4	0.5	6	0.7	10	1.1
Bronquiectasia	0	0	0	1	0	1	2	0	2	4	3	7	7	0.8	3	0.3	10	1.1
Anemia aplásica, sin otra especificación	0	0	0	3	0	3	2	2	4	2	0	2	7	0.8	2	0.2	9	1.0
Neumonitis debida a aspiración de alimento o vómito	0	0	0	1	0	1	3	1	4	3	1	4	7	0.8	2	0.2	9	1.0
Insuficiencia renal aguda, no especificada	0	0	0	1	0	1	0	0	0	7	1	8	8	0.9	1	0.1	9	1.0
Diabetes mellitus no insulino dependiente, con complicaciones circulatorias periféricas	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0.9	0	0.0	8	0.9
Todas las demás enfermedades	7	5	12	23	29	52	92	87	179	95	99	194	217	24.7	220	25.0	437	49.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2015

Gráfico Nº 18.- Diez primeras causas Servicio de Medicina “B”





Gráfico Nº 19.- Egresos Hospitalarios Servicio de Medicina “A”, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS, Y SEXO

Las principales causas de egresos hospitalarios del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas el 60.9% representa al sexo masculino y el 39.1% al sexo femenino. La primera causa Enfermedad por VIH, resultante en infección por micro bacterias con el 13.4% con respecto al total de las atenciones correspondiendo al 9.7% al sexo masculino y el 3.8% al sexo femenino. La segunda causa Enfermedad por virus de la

inmunodeficiencia humana (VIH) sin otra especificación con el 7.3% correspondiendo el 5.6% al sexo masculino y el 1.7% al sexo femenino. La tercera causa Enfermedad por VIH, resultantes en otras micosis con el 5.8%, correspondiendo el 4.2% al sexo masculino y el 1.6% al sexo femenino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los pacientes jóvenes. (Cuadro Nº11. Gráfico Nº 20,21).

Cuadro Nº11.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA DPTO. DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, TROPICALES Y DERMATOLÓGICAS AÑO: 2015																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias	0	0	0	22	5	27	40	19	59	0	0	0	62	9.7	24	3.8	86	13.4
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	0	0	0	13	2	15	21	9	30	2	0	2	36	5.6	11	1.7	47	7.3
Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis	0	0	0	9	3	12	16	7	23	2	0	2	27	4.2	10	1.6	37	5.8
Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones bacterianas	0	0	0	4	0	4	12	4	16	2	1	3	18	2.8	5	0.8	23	3.6
Celulitis de otras partes de los miembros	1	0	1	4	1	5	3	4	7	5	2	7	13	2.0	7	1.1	20	3.1
Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad infecciosa o parasitaria no especific	1	0	1	2	2	4	7	2	9	0	0	0	10	1.6	4	0.6	14	2.2
Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mención de complicación	0	0	0	0	0	0	0	5	5	4	5	9	4	0.6	10	1.6	14	2.2
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	0	1	1	2	3	0	4	4	4	2	6	5	0.8	9	1.4	14	2.2	
Encefalitis viral, no especificada	5	0	5	4	1	5	1	0	1	0	0	0	10	1.6	1	0.2	11	1.7
Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por Pneumocystis carinii	0	0	0	2	2	4	5	1	6	0	0	0	7	1.1	3	0.5	10	1.6
Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias	0	0	0	2	1	3	3	3	6	1	0	1	6	0.9	4	0.6	10	1.6
Septicemia, no Especificada	0	1	1	2	0	2	3	2	5	0	0	0	5	0.8	3	0.5	8	1.3
Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales	0	0	0	2	1	3	4	1	5	0	0	0	6	0.9	2	0.3	8	1.3
Enfermedad por VIH, resultante en encefalopatía	0	0	0	0	0	0	2	5	7	0	0	0	2	0.3	5	0.8	7	1.1
Neumonía, no especificada	0	0	0	0	1	1	1	2	3	1	2	3	2	0.3	5	0.8	7	1.1
Insuficiencia respiratoria, no especificada	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	6	4	0.6	3	0.5	7	1.1
Todas las demás enfermedades	6	10	16	42	33	75	86	66	152	39	35	74	173	27.0	144	22.5	317	49.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-HNCH-2015

Gráfico Nº20.- Diez primeras causas Departamento de Enfermedades Tropicales y Dermatológicas.





Gráfico Nº 21.- Egresos Hospitalarios Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "A", Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "A", el 57.8% representa al sexo masculino y el 42.2% al sexo femenino. La primera causa Hiperplasia de la próstata con el 7.2% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Uropatía obstructiva y por reflujo, sin otra especificación, con el 6.5%

con respecto al total de atenciones, correspondiendo el 6.4% al sexo masculino, y el 0.1% al sexo femenino. La tercera causa Traumatismo intracraneal, no especificado con el 4.2%, correspondiendo al sexo masculino el 3.4% y al sexo femenino el 0.8%. (Cuadro Nº12. Gráfico Nº 22,23).

Cuadro Nº12.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA																		
SERVICIO DE CIRUGIA "A"																		
AÑO: 2015																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	17	13	30	81	35	116	163	206	369	248	117	365	509	57.8	371	42.2	880	100.00
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	1	0	1	4	0	4	58	0	58	63	7.2	0	0.0	63	7.2
Uropatía obstructiva y por reflujo, sin otra especificación	0	0	0	0	0	0	8	1	9	48	0	48	56	6.4	1	0.1	57	6.5
Traumatismo intracraneal, no especificado	0	0	0	11	2	13	11	4	15	8	1	9	30	3.4	7	0.8	37	4.2
Tumor maligno de la glándula tiroides	0	1	1	1	3	4	0	21	21	1	6	7	2	0.2	31	3.5	33	3.8
Tumor maligno de la mama, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	1	19	20	0	10	10	1	0.1	29	3.3	30	3.4
Tumor maligno del estómago, parte no especificada	0	0	0	0	1	1	2	4	6	5	10	15	7	0.8	15	1.7	22	2.5
Otros desplazamientos especificados de disco intervertebral	1	0	1	1	1	2	12	2	14	1	2	3	15	1.7	5	0.6	20	2.3
Tumor de comportamiento incierto o desconocido del riñón	0	0	0	0	0	0	2	9	11	2	3	5	4	0.5	12	1.4	16	1.8
Cálculo del riñón	0	1	1	0	0	0	2	9	11	2	1	3	4	0.5	11	1.3	15	1.7
Hemorragia subdural traumática	0	0	0	0	0	0	5	0	5	9	0	9	14	1.6	0	0.0	14	1.6
Hemorragia subdural (aguda) (no traumática)	0	0	0	1	1	2	1	0	1	7	3	10	9	1.0	4	0.5	13	1.5
Tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	4	4	0	0.0	12	1.4	12	1.4
Bocio no tóxico, no especificado	0	0	0	0	2	2	2	7	9	0	1	1	2	0.2	10	1.1	12	1.4
Tumor maligno del ovario	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0.0	11	1.3	11	1.3
Tumor maligno del colon, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	3	8	5	0.6	5	0.6	10	1.1
Tumor maligno de la próstata	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	0	9	10	1.1	0	0.0	10	1.1
Estrechez uretral, no especificada	1	0	1	3	0	3	1	1	2	2	2	4	7	0.8	3	0.3	10	1.1
Hemorragia epidural	3	1	4	3	0	3	2	0	2	1	0	1	9	1.0	1	0.1	10	1.1
Tumor maligno del recto	0	0	0	1	0	1	0	4	4	2	2	4	3	0.3	6	0.7	9	1.0
Otitis media, no especificada	0	3	3	0	0	0	2	2	4	1	1	2	3	0.3	6	0.7	9	1.0
Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	7	4	0.5	4	0.5	8	0.9
Tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	1	0	0.0	7	0.8	7	0.8
Tumor de comportamiento incierto o desconocido del testículo	0	0	0	2	0	2	2	0	2	3	0	3	7	0.8	0	0.0	7	0.8
Pólipo nasal, no especificado	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	2	3	3	0.3	4	0.5	7	0.8
Malformación arteriovenosa de los vasos cerebrales	0	1	1	1	2	3	3	0	3	0	0	0	4	0.5	3	0.3	7	0.8
Todas las demás enfermedades	12	6	18	56	23	79	99	94	193	80	61	141	247	28.1	184	20.9	431	49.0

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº22.- Diez primera causa Servicio de Cirugía "A".





Gráfico Nº23.- Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía "A", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGIA "B", Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Cirugía "B", el 56.5% representa al sexo femenino y el 43.5% al sexo masculino. La primera causa Apendicitis aguda, no especificada con el 23.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 10.9% al sexo femenino y el 12.2% al sexo masculino. La segunda causa Cálculos de la vesícula biliar sin colecistitis con el 15.3% correspondiendo el 12.8% al

sexo femenino y el 2.5% al sexo masculino. La tercera causa Cálculos de la vesícula biliar, con otras colecistitis con el 9.4%, correspondiendo el 7.0% al sexo femenino y el 2.4% al sexo masculino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los adultos mayores. (Cuadro Nº13. Gráfico Nº 24,25).

Cuadro Nº13.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B". y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE CIRUGIA "B" AÑO: 2015																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
Apendicitis aguda, no especificada	29	34	63	112	91	203	101	98	199	25	15	40	267	12.2	238	10.9	505	23.1
Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	0	3	3	5	29	34	30	169	199	19	80	99	54	2.5	281	12.8	335	15.3
Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	0	3	3	4	15	19	26	94	120	23	41	64	53	2.4	153	7.0	206	9.4
Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangren	1	0	1	4	3	7	38	19	57	82	38	120	125	5.7	60	2.7	185	8.5
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	14	6	20	28	15	43	44	36	80	11	9	20	97	4.4	66	3.0	163	7.5
Otras hernias ventrales y las no especificadas sin obstrucción o gangre	0	0	0	1	2	3	15	30	45	16	29	45	32	1.5	61	2.8	93	4.3
Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena	0	0	0	0	2	2	12	22	34	14	18	32	26	1.2	42	1.9	68	3.1
Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda	0	0	0	2	7	9	14	24	38	10	8	18	26	1.2	39	1.8	65	3.0
Colecistitis aguda	0	0	0	2	6	8	15	20	35	11	8	19	28	1.3	34	1.6	62	2.8
Pancreatitis biliar aguda	0	0	0	2	10	12	6	14	20	4	5	9	12	0.5	29	1.3	41	1.9
Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas	2	0	2	3	1	4	6	9	15	7	10	17	18	0.8	20	0.9	38	1.7
Traumatismo no especificado del abdomen, de la región lumbosacra y	1	0	1	10	0	10	18	3	21	1	0	1	30	1.4	3	0.1	33	1.5
Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena	0	0	0	0	0	0	3	7	10	16	5	21	19	0.9	12	0.5	31	1.4
Enfermedad de la vesícula biliar, no especificada	0	0	0	2	0	2	5	10	15	2	6	8	9	0.4	16	0.7	25	1.1
Colangitis	0	0	0	0	1	1	4	3	7	6	6	12	10	0.5	10	0.5	20	0.9
Todas las demás enfermedades	6	2	8	26	27	53	69	71	140	44	72	116	145	6.6	172	7.9	317	14.5

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº24.- Diez primeras causas, Servicio de Cirugía "B".





Gráfico Nº25.- Egresos Hospitalarios, Servicio de Cirugía "B", según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA ADULTOS, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Adultos, el 60.1% representa al sexo masculino y el 39.9% al sexo femenino. La primera causa Fractura del cuello de fémur con el 8.4% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 5.7% al sexo femenino y el 2.7% al sexo masculino. La segunda causa Fractura de otras partes de la

pierna con el 6.9% correspondiendo el 4.0% al sexo femenino y el 2.8% al sexo masculino. La tercera causa Fractura de la diáfisis de la tibia con el 6.6%, correspondiendo el 1.3% al sexo femenino y el 5.3% al sexo masculino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos seguido de los pacientes adultos mayores. (Cuadro Nº14. Gráfico Nº 26,27).

Cuadro Nº14.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio de Traumatología Adultos, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA I AÑO: 2015																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	22	8	30	156	59	215	265	143	408	106	155	261	549	60.1	365	39.9	914	100
Fractura del cuello de fémur	0	2	2	1	1	2	7	6	13	17	43	60	25	2.7	52	5.7	77	8.4
Fractura de otras partes de la pierna	0	0	0	7	13	20	17	20	37	2	4	6	26	2.8	37	4.0	63	6.9
Fractura de la diáfisis de la tibia	2	0	2	14	3	17	27	8	35	5	1	6	48	5.3	12	1.3	60	6.6
Fractura petrocanteriana	0	0	0	0	1	1	4	3	7	15	29	44	19	2.1	33	3.6	52	5.7
Gonartrosis, no especificada	0	0	0	0	1	1	1	6	7	9	14	23	10	1.1	21	2.3	31	3.4
Luxación de la articulación del tobillo	2	0	2	5	2	7	10	7	17	2	2	4	19	2.1	11	1.2	30	3.3
Coxartrosis, no especificada	0	0	0	2	1	3	5	5	10	5	7	12	12	1.3	13	1.4	25	2.7
Fractura del fémur, parte no especificada	1	0	1	4	7	11	3	3	6	1	3	4	9	1.0	13	1.4	22	2.4
Fractura de la epifisis superior de la tibia	0	0	0	1	1	2	8	5	13	3	4	7	12	1.3	10	1.1	22	2.4
Traumatismo no especificado de la muñeca y de la mano	2	0	2	6	1	7	9	0	9	2	0	2	19	2.1	1	0.1	20	2.2
Fractura de la epifisis inferior del radio	0	1	1	1	0	1	8	7	15	1	1	2	10	1.1	9	1.0	19	2.1
Fractura de la epifisis inferior de la tibia	1	0	1	1	1	2	6	3	9	2	4	6	10	1.1	8	0.9	18	2.0
Fractura de la diáfisis del húmero	1	1	2	5	2	7	4	2	6	1	1	2	11	1.2	6	0.7	17	1.9
Otros trastornos de los meniscos	0	0	0	4	0	4	4	7	11	1	0	1	9	1.0	7	0.8	16	1.8
Fractura de la rótula	0	0	0	4	1	5	6	1	7	1	2	3	11	1.2	4	0.4	15	1.6
Todas las demás enfermedades	13	4	17	101	24	125	146	60	206	39	40	79	299	32.7	128	14.0	427	46.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº 26.- Diez primeras causas Servicio de Traumatología Adultos.





Gráfico Nº27.- Egresos Hospitalarios, Servicio de Traumatología Adultos, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA NIÑOS, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Traumatología Niños, el 68.4% representa al sexo masculino y el 31.6% al sexo femenino. La primera causa Fractura de la epífisis inferior del húmero con el 22.1% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 12.1% al sexo masculino y el 10.0% al sexo femenino. La segunda causa Fractura de la diáfisis del

cúbito y del radio con el 6.8% correspondiendo el 5.3% al sexo masculino y el 1.6% al sexo femenino. La tercera causa Fractura de la diáfisis de la tibia con el 6.3%, correspondiendo el 4.7% al sexo masculino y el 1.6% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los niños de 0-11 años. (Cuadro Nº15. Gráfico Nº 28,29).

Cuadro Nº15.- Principales causas en Egresos Hospitalarios Servicio de Traumatología Niños, y sexo

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA II AÑO: 2015												
CAUSAS	NIÑOS			ADOLESCENTE			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	99	50	149	31	10	41	130	68.4	60	31.6	190	100
Fractura de la epífisis inferior del húmero	23	19	42	0	0	0	23	12.1	19	10.0	42	22.1
Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio	5	1	6	5	2	7	10	5.3	3	1.6	13	6.8
Fractura de la diáfisis de la tibia	8	3	11	1	0	1	9	4.7	3	1.6	12	6.3
Fractura de la epífisis inferior del cúbito y del radio	7	1	8	3	0	3	10	5.3	1	0.5	11	5.8
Fractura de la epífisis inferior del radio	5	1	6	4	0	4	9	4.7	1	0.5	10	5.3
Fractura de la diáfisis del fémur	3	3	6	2	0	2	5	2.6	3	1.6	8	4.2
Fracturas múltiples del antebrazo	4	2	6	1	0	1	5	2.6	2	1.1	7	3.7
Traumatismo no especificado de la muñeca y de la mano	4	1	5	1	1	2	5	2.6	2	1.1	7	3.7
Fractura de la epífisis inferior de la tibia	3	1	4	3	0	3	6	3.2	1	0.5	7	3.7
Fractura del fémur, parte no especificada	3	0	3	1	1	2	4	2.1	1	0.5	5	2.6
Todas las demás enfermedades	34	18	52	10	6	16	44	23.2	24	12.6	68	35.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº28.- Diez primeras causas, Servicio de Traumatología Niños.





Gráfico Nº29.- Egresos Hospitalarios, Servicio de Traumatología Niños, según sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA I, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría I, el 54.1% representa al sexo masculino y el 45.9% al sexo femenino. La primera causa Apendicitis aguda, no especificada con el 12.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 7.3% al sexo masculino y el 5.5% al sexo femenino. La segunda causa Asma, no especificado con el 12.0%

correspondiendo el 6.3% al sexo masculino y el 5.7% al sexo femenino. La tercera causa Neumonía viral, no especificada con el 7.8%, correspondiendo el 4.0% al sexo masculino y el 3.8% al sexo femenino, observándose que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes de 0.-11 años. (Cuadro Nº16. Gráfico Nº 30,31).

Cuadro Nº16.- Principales causas en Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE PEDIATRIA I AÑO: 2015												
CAUSAS	NIÑOS			ADOLESCENTES			TOTALES					
	0-11 años			12-17 años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	624	516	1140	74	77	151	698	54.1	593	45.9	1291	100.00
Apendicitis aguda, no especificada	77	53	130	17	18	35	94	7.3	71	5.5	165	12.8
Asma, no especificado	78	69	147	3	5	8	81	6.3	74	5.7	155	12.0
Neumonía viral, no especificada	52	49	101	0	0	0	52	4.0	49	3.8	101	7.8
Epilepsia, tipo no especificado	43	32	75	6	7	13	49	3.8	39	3.0	88	6.8
Encefalitis viral, no especificada	36	30	66	5	5	10	41	3.2	35	2.7	76	5.9
Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	23	15	38	6	5	11	29	2.2	20	1.5	49	3.8
Bronquiolitis aguda, no especificada	27	16	43	0	0	0	27	2.1	16	1.2	43	3.3
Traumatismo intracraneal, no especificado	20	13	33	2	0	2	22	1.7	13	1.0	35	2.7
Celulitis de otras partes de los miembros	11	7	18	1	0	1	12	0.9	7	0.5	19	1.5
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9	7	16	1	0	1	10	0.8	7	0.5	17	1.3
Todas las demás enfermedades	248	225	473	33	37	70	281	21.8	262	20.3	543	42.1

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº30.- Diez primeras causas Servicio Pediatría I.





Gráfico Nº31.- Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría I, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA II, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría II, el 59.8% representa al sexo masculino y el 40.2% al sexo femenino. La primera causa Neumonía viral, no especificada con el 21.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 8.5% al sexo femenino y el 13.3% al sexo masculino. La segunda causa Bronquiolitis aguda, no especificada, con el 10.9% correspondiendo el 6.7% al sexo

masculino y el 4.2% al sexo femenino. La tercera causa Ictericia neonatal, no especificada con el 5.0%, correspondiendo el 3.4% al sexo masculino y el 1.6% al sexo femenino, así mismo podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los niños de 1 a 11 meses, seguido de los niños de 1-2 años. (Cuadro Nº17. Gráfico Nº 32,33).

Cuadro Nº17.- Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio pediatría II, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE PEDIATRIA II AÑO: 2015																		
CAUSAS	0-28 DIAS			1-11 MESES			1-2 AÑOS			3-4 AÑOS			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	61	45	106	175	112	287	65	46	111	1	0	1	302	59.8	203	40.2	505	100.00
Neumonía viral, no especificada	1	0	1	47	31	78	19	12	31	0	0	0	67	13.3	43	8.5	110	21.8
Bronquiolitis aguda, no especificada	0	0	0	33	19	52	1	2	3	0	0	0	34	6.7	21	4.2	55	10.9
Ictericia neonatal, no especificada	17	8	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3.4	8	1.6	25	5.0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	0	0	0	7	6	13	10	0	10	0	0	0	17	3.4	6	1.2	23	4.6
Epilepsia, tipo no especificado	0	0	0	6	4	10	4	5	9	0	0	0	10	2.0	9	1.8	19	3.8
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	0	0	0	6	8	14	2	0	2	0	0	0	8	1.6	8	1.6	16	3.2
Alteración no especificada de la regulación de la temperatura en el recién nacido	9	5	14	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9	1.8	6	1.2	15	3.0
Tos ferina, no especificada	1	0	1	6	4	10	0	0	0	0	0	0	7	1.4	4	0.8	11	2.2
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas especificadas	0	0	0	4	3	7	0	4	4	0	0	0	4	0.8	7	1.4	11	2.2
Neumonía congénita debida a agente viral	7	2	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	8	1.6	2	0.4	10	2.0
Todas las demás enfermedades	26	30	56	65	36	101	29	23	52	1	0	1	121	24.0	89	17.6	210	41.6

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº32.- Diez primeras causas, Servicio pediatría II, y sexo





Gráfico Nº33.- Egresos Hospitalarios, Servicio Pediatría II, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE RECIEN NACIDOS (INTERMEDIOS), Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Recién Nacidos (Intermedios), el 51.1% representa al sexo masculino y el 48.9% al sexo femenino. La primera causa Ictericia neonatal, no especificada con el 38.7% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 20.7% al sexo femenino y el 18.0% al sexo

masculino. La segunda causa, Otros recién nacidos pre término con el 12.9% correspondiendo el 6.3% al sexo masculino y el 6.5% al sexo femenino. La tercera causa Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada con el 5.3%, correspondiendo el 2.4% al sexo masculino y el 2.9% al sexo femenino. (Cuadro Nº18. Gráfico Nº 34,35).

Cuadro Nº29.- Principales causas en egresos Hospitalarios, Servicio Recién Nacidos, y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE RECIEN NACIDOS INTERMEDIOS AÑO: 2015												
CAUSAS	0-29 DIAS			1-11 MESES			TOTALES					
							TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N°	%
	437	412	849	24	29	53	461	51.1	441	48.9	902	100.00
Ictericia neonatal, no especificada	162	187	349	0	0	0	162	18.0	187	20.7	349	38.7
Otros recién nacidos pretérmino	50	50	100	7	9	16	57	6.3	59	6.5	116	12.9
Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada	22	26	48	0	0	0	22	2.4	26	2.9	48	5.3
Otros recién nacidos con sobrepeso para la edad gestacional	19	15	34	0	0	0	19	2.1	15	1.7	34	3.8
Taquipnea transitoria del recién nacido	17	9	26	0	0	0	17	1.9	9	1.0	26	2.9
Otras dificultades respiratorias del recién nacido	12	13	25	1	0	1	13	1.4	13	1.4	26	2.9
Ictericia neonatal por otras causas especificadas	12	13	25	0	0	0	12	1.3	13	1.4	25	2.8
Pequeño para la edad gestacional	15	7	22	0	0	0	15	1.7	7	0.8	22	2.4
Otras lesiones especificadas del encéfalo, debidas a traumatismo	11	6	17	0	0	0	11	1.2	6	0.7	17	1.9
Disritmia cardíaca neonatal	10	6	16	0	0	0	10	1.1	6	0.7	16	1.8
Todas las demás enfermedades	107	80	187	16	20	36	123	13.6	100	11.1	223	24.7

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº34.-Diez primeras causas, Servicio Recién Nacidos, y sexo.





Gráfico Nº35.- Egresos Hospitalarios, Servicio Recién Nacidos, según sexo.



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE GINECOLOGIA

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Ginecología. La primera causa Aborto espontáneo incompleto, sin complicaciones con el 23.6% con respecto al total de las atenciones. La

segunda causa Leiomioma del útero, sin otra especificación con el 12.2%. La tercera causa Prolapso genital femenino, no especificado con el 10.5%. (Cuadro Nº18. Gráfico Nº 36).


Cuadro Nº18.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Ginecología

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE GINECOLOGIA AÑO:2015						
CAUSAS	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR	TOTALES	
	12-17 años	18-29 años	30-59 años	60 a + años	Nº	%
	F	F	F	F		
Aborto espontáneo incompleto, sin complicación	31	157	114	0	302	23.6
Leiomioma del útero, sin otra especificación	1	3	151	1	156	12.2
Prolapso genital femenino, no especificado	0	2	71	61	134	10.5
Otros quistes ováricos y los no especificados	12	45	72	5	134	10.5
Hiperemesis gravídica leve	1	48	18	0	67	5.2
Embarazo ectópico, no especificado	2	37	20	0	59	4.6
Infección del riñón en el embarazo	3	38	13	0	54	4.2
Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada	3	12	22	1	38	3.0
Otros embarazos ectópicos	1	17	13	0	31	2.4
Enfermedad inflamatoria pélvica femenina, no especificada	2	8	12	0	22	1.7
Todas las demás enfermedades	17	131	120	14	282	22.0

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº36.-Diez primeras causas, Servicio de Ginecología



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE OBSTETRICIA

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Obstetricia. La primera causa Parto por cesárea, sin otra especificación con el 26.3% con respecto al total de las atenciones. La segunda causa Parto por cesárea electiva con el 18.7%. La

tercera causa Trabajo de parto prematuro con parto prematuro con el 2.0%. Asimismo se observa que la mayor demanda de atención correspondió al Parto único espontáneo, sin otra especificación con el 43.4% (Cuadro Nº19. Gráfico Nº 37).


Cuadro Nº19.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Obstetricia

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA SERVICIO DE OBSTETRICIA AÑO: 2015						
CAUSAS	ADOLESCENTE		JOVEN	ADULTO	TOTALES	
	12-17 años	18-29 años	30-59 años		N°	%
	F	F	F			
	279	2877	1525		4681	100.00
Parto por cesárea, sin otra especificación	85	795	350		1230	26.3
Parto por cesárea electiva	6	463	408		877	18.7
Trabajo de parto prematuro con parto prematuro	8	53	34		95	2.0
Infección del riñón en el embarazo	5	33	6		44	0.9
Parto múltiple, todos por cesárea	1	17	15		33	0.7
Otros partos únicos asistidos especificados	1	20	9		30	0.6
Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1	20	7		28	0.6
Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación	2	15	9		26	0.6
Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo	0	14	3		17	0.4
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias maternas que complican el embarazo, el	0	8	8		16	0.3
Todas las demás enfermedades	16	144	95		255	5.4
Parto único espontáneo, sin otra especificación	154	1295	581		2030	43.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº37.- primeras causas, Servicio de Obstetricia, y sexo



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE NEUMOLOGIA, Y SEXO.

Las principales causas de egresos hospitalarios del Servicio de Neumología, el 52.1% representa al sexo femenino y el 47.9% al sexo masculino. La primera causa Tuberculosis de pulmón, confirmada por hallazgos microscópicos de bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo, con el 21.8% con respecto al total de las atenciones correspondiendo 9.2% al sexo femenino y el 12.7% al sexo masculino. La segunda causa Tuberculosis de pulmón, sin

mención de confirmación bacteriológica o histológica con el 9.9% correspondiendo el 4.9% al sexo femenino y el 4.9% al sexo masculino. La tercera causa Tuberculosis de pulmón, con examen bacteriológico e histológico negativo, con el 5.6%, correspondiendo el 3.5% al sexo masculino y el 2.1% al sexo femenino, observamos que el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados son los pacientes adultos. (Cuadro Nº20. Gráfico Nº 39,40).

Cuadro Nº20.-Principales causas en Egresos Hospitalarios, servicio de Neumología y sexo.

PRINCIPALES CAUSAS EN EGRESOS HOSPITALARIOS, POR ETAPA DE VIDA																		
SERVICIO DE NEUMOLOGIA																		
AÑO: 2015																		
CAUSAS	ADOLESCENTE			JOVEN			ADULTO			ADULTO MAYOR			TOTALES					
	12-17 años			18-29 años			30-59 años			60 a + años			TOTALES					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	%	F	%	N*	%
Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin c	0	0	0	2	4	6	10	5	15	6	4	10	18	12.7	13	9.2	31	21.8
Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica	1	0	1	3	3	6	2	4	6	1	0	1	7	4.9	7	4.9	14	9.9
Tuberculosis del pulmón, con examen bacteriológico e histológico negativos	0	1	1	2	1	3	1	1	2	2	0	2	5	3.5	3	2.1	8	5.6
Bronquiectasia	0	0	0	0	3	3	4	1	5	0	0	0	4	2.8	4	2.8	8	5.6
Equinocosis, otra y la no especificada	0	0	0	1	1	2	1	3	4	1	0	1	3	2.1	4	2.8	7	4.9
Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	2	2	2	1.4	5	3.5	7	4.9
Pleurésia tuberculosa, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica	1	0	1	2	2	4	1	0	1	0	0	0	4	2.8	2	1.4	6	4.2
Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	3	3	2	1.4	4	2.8	6	4.2
Neumotórax, no especificado	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	1	2	1	0.7	4	2.8	5	3.5
Tuberculosis respiratoria no especificada, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica	0	0	0	0	1	1	2	1	3	0	0	0	2	1.4	2	1.4	4	2.8
Todas las demás enfermedades	1	0	1	5	2	7	10	12	22	4	12	16	20	14.1	26	18.3	46	32.4

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº38.- Diez primeras causas, Servicio Neumología, y sexo.





Gráfico Nº39.- Egresos Hospitalarios, Servicio Neumología, según sexo.



HOSPITALIZACION POR LUGAR DE PROCEDENCIA

La mayor demanda en egresos hospitalarios según lugar de procedencia y sexo, fueron los distritos del cono Norte. San Martín con el 30.0%, correspondió al sexo femenino el 20.2% y el 9.7 para el sexo masculino. El distrito de los Olivos con el 20.0%, correspondió al sexo femenino el 15.4% y el 4.6% para el sexo masculino. El distrito de Independencia con el 17.6%, correspondió al sexo femenino el 13.0% y el 4.5% para el

sexo masculino. Asimismo se observó en Lima Metropolitana que representó el 6.0% del total de los egresos hospitalarios, correspondió al sexo femenino el 3.6% y el 2.4% para el sexo masculino. Con respecto al cercado de Lima representó el 4.4% del total de los egresos y los Departamentos de Lima representó el 2.8% de los egresos. (Cuadro N° 26. Gráfico N° 51)


Cuadro Nº 26.- Egresos Hospitalarios según lugar de procedencia y sexo.

EGRESOS HOSPITALARIOS SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO						
AÑO:2015						
	DISTRITOS		F	M	TOTAL	%
			10356	4888	15244	100.0
LIMA	CERCADO	LIMA	367	299	666	4.4
		DISTRITOS CONO NORTE	8873	3872	12745	83.6
	CONO NORTE	SAN MARTIN DE PORRES	3083	1486	4569	30.0
		LOS OLIVOS	2351	702	3053	20.0
		INDEPENDENCIA	1987	691	2678	17.6
		RIMAC	432	392	824	5.4
		COMAS	542	276	818	5.4
		PUENTE PIEDRA	274	189	463	3.0
		CARABAYLLO	162	107	269	1.8
		ANCON	42	29	71	0.5
		METROPOLITANA	553	362	915	6.0
		METROPOLITANA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	209	113	322
	ATE		27	25	52	0.3
	BREÑA		31	16	47	0.3
	SAN JUAN DE MIRAFLORES		24	17	41	0.3
	LA VICTORIA		20	19	39	0.3
	EL AGUSTINO		25	12	37	0.2
	VILLA EL SALVADOR		20	16	36	0.2
	PACHACAMAC		21	13	34	0.2
	SAN MIGUEL		24	10	34	0.2
	SANTA ANITA		24	9	33	0.2
	CHORRILLOS		16	14	30	0.2
	JESUS MARIA		19	6	25	0.2
	SANTIAGO DE SURCO		13	12	25	0.2
	LINCE		12	12	24	0.2
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO		11	11	22	0.1
	SAN LUIS		5	13	18	0.1
	SURQUILLO		7	8	15	0.1
	PUEBLO LIBRE		12	2	14	0.1
	MAGDALENA DEL MAR	6	7	13	0.1	
	MIRAFLORES	3	6	9	0.1	
	SAN ISIDRO	3	5	8	0.1	
	OTROS	21	16	37	0.2	
PROVINCIAS	167	88	255	1.7		
PROVINCIAS	HUAROCHIRI	74	15	89	0.6	
	HUARAL	35	35	70	0.5	
	BARRANCA	22	9	31	0.2	
	CAÑETE	19	9	28	0.2	
	HUAURA	11	14	25	0.2	
	OTROS	6	6	12	0.1	
PROVINCIAS	CALLAO	140	85	225	1.5	
PROVINCIAS	CALLAO	106	58	164	1.1	
	VENTANILLA	31	20	51	0.3	
	OTROS	3	7	10	0.1	
DEPARTAMENTOS	255	179	434	2.8		
DEPARTAMENTOS	ANCASH	41	35	76	0.5	
	CAJAMARCA	17	19	36	0.2	
	JUNIN	29	7	36	0.2	
	SAN MARTIN	17	17	34	0.2	
	HUANUCO	20	11	31	0.2	
	ICA	23	8	31	0.2	
	LA LIBERTAD	12	16	28	0.2	
	LAMBAYEQUE	12	15	27	0.2	
	PIURA	17	5	22	0.1	
	LORETO	12	8	20	0.1	
	APURIMAC	8	7	15	0.1	
	AYACUCHO	10	3	13	0.1	
	AMAZONAS	6	6	12	0.1	
	TUMBES	8	3	11	0.1	
OTROS DEPARTAMENTOS	23	19	42	0.3		
EXTRANJERO	EXTRANJERO	1	3	4	0.03	

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS

ELABORADO: OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA-HNCH-2015

Gráfico Nº 51.- Egresos Hospitalarios, según lugar de procedencia.



EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO.

En cuanto a los egresos hospitalarios por grupo de edad y sexo, el grupo de mayor demanda de egresos fue de 15 a 19 años con el 13.5%. En segundo orden de 0 a 4 años con el 11.4%, En tercer orden de 60 a 65 a más años con el 11.8%, Asimismo se observa que el sexo femenino del grupo de 15-19

años representa 11.6%, En segundo orden del grupo de 20.24 años con el 9.2%. En tercer orden del grupo de 25 a 29 años el 7.3%. En cuanto al sexo masculino el grupo de 0-4 años representa 7.3%. En segundo orden el grupo de 65 a más años representa el 5.8%. (Cuadro Nº 27).

Cuadro Nº 27.- Egresos Hospitalarios por grupo de edad y sexo.

PIRAMIDE POBLACIONAL EN HOSPITALIZACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO						
AÑO:2015						
GRUPO DE EDAD	Hombre	%	Mujer	%	N	%
TOTAL	4888	32.1	10356	67.9	15244	100
0-4años	1106	7.3	939	6.2	2045	13.4
5-9años	232	1.5	213	1.4	445	2.9
10-14años	246	1.6	1095	7.2	1341	8.8
15-19años	294	1.9	1766	11.6	2060	13.5
20-24años	233	1.5	1407	9.2	1640	10.8
25-29años	215	1.4	1110	7.3	1325	8.7
30-34años	210	1.4	879	5.8	1089	7.1
35-39años	220	1.4	536	3.5	756	5.0
40-44años	233	1.5	381	2.5	614	4.0
45-49años	243	1.6	347	2.3	590	3.9
50-54años	248	1.6	309	2.0	557	3.7
55-59años	289	1.9	204	1.3	493	3.2
60-64años	229	1.5	263	1.7	492	3.2
65 A +años	890	5.8	907	5.9	1797	11.8

FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH

PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO


La Pirámide Poblacional es una herramienta gráfica que se usa para estudiar la composición por edad y sexo de una población, nos permite visualizar en forma fácil el tipo de estructura de la población que

acude a la institución, las barras nos permiten hacer comparaciones y tener una rápida percepción de lo que necesitamos representar. (Gráfico Nº52).

Gráfico Nº 52.- Pirámide Poblacional – Egresos Hospitalarios

PIRAMIDE POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

AÑO: 2015



FUENTE: EGRESOS HOSPITALARIOS
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNCH